

A close-up photograph of a plant stem and several long, curved green leaves. The leaves are layered, with some in the foreground and others in the background, creating a sense of depth. The lighting is bright, highlighting the texture of the leaves and the stem.

By Chao-Cheng Yeh, Ph.D., L.Ac. 09/20/2020 v1.1

DAOM964B 金匱要略醫案選讀 II

金匱要略本次討論章節

- 肺痿肺癰咳嗽上氣病脈證並治第七
- 五臟風寒積聚病脈證並治第十一
- 痰飲咳嗽病脈證並治第十二

肺痿肺癰咳嗽上氣病脈證並治第七

- 甘草乾薑湯
- 射干麻黃湯
- 皂莢丸
- 厚朴麻黃湯 / 澤漆湯
- 麥門冬湯
- 葶藶大棗瀉肺湯
- 桔梗湯
- 越婢加半夏湯
- 小青龍加石膏湯

甘草乾薑湯

- 肺痿，吐涎沫而不咳者，必遺尿，小便數，所以然者，以上虛不能制下故也。此為肺中冷，必眩多涎唾，甘草乾薑湯以溫之；若服湯已渴者，屬消渴。
- 甘草乾薑湯方：
 - 甘草 炙四兩 乾薑 炮二兩
 - 右口父咀，以水三升，煮取一升五合，去滓，分溫再服

甘草乾薑湯病案一

- 病人資料：
 - 性別：女性
 - 年齡： 20+
 - 主述症狀：
 - 常覺頭重眩暈
 - 最近感咽喉如有食物塞住，而喉頭略有閉塞之狀。

甘草乾薑湯病案一

- 其他症狀：
 - 憂鬱
 - 精神不佳
 - 胃腸脹滿
 - 偶而下痢
 - 喉頭閉塞，用力喀不出，有時自消。

甘草乾薑湯病案一

- 處方：

炙甘草 12g 乾薑 6g 半夏 12g

厚朴 9g 茯苓 12g 生薑 9g

蘇葉 12g

- 三劑諸症盡除。續服一星期，以後不再發。
- 半夏厚朴湯合甘草乾薑湯名為寬中湯。為日本漢醫之創案，對胃虛之感冒頗多應用的機會。

半夏厚朴湯

- 《金匱要略》條文：
 - 婦人咽中如有炙臠，半夏厚朴湯主之。
- 組成：
 - 半夏一升 厚朴三兩 茯苓四兩
生薑五兩 乾蘇葉二兩
- 右五味，以水七升，煮取四升，分溫四服，日三夜一服。

甘草乾薑湯病案二

- 病人資料：
 - 性別：女性
 - 年齡： 50+
 - 主述症狀：
 - 平素體虛
 - 近日患感冒，上逆頭痛

甘草乾薑湯病案二

- 其他症狀：
 - 白云由臍下如有動氣上衝胸中，以至咽喉，遂感咽喉窒息，氣欲絕
 - 嘔吐
 - 自汗振顫
 - 口苦
 - 心悸亢進

甘草乾薑湯病案二

- 處方：
 - 炙甘草 12g 乾薑 6g 半夏 12g
厚朴 9g 茯苓 12g 生薑 6g
蘇葉 12g
- 三劑諸症消失無餘

射干麻黃湯

- 咳而上氣，喉中水雞聲，射干麻黃湯主之
- 組成：
 - 射干十三枚 麻黃四兩 生薑四兩
細辛 紫莞 款冬花各三兩 五味子半升
大棗七枚 半夏（大者洗）八枚
- 右九味，以水一斗二升，先煮麻黃兩沸，去上沫，內諸藥，煮取三升，分溫三服。

射干麻黃湯病案一

- 病人資料：
 - 性別：男性
 - 年齡： 30+
 - 主述症狀：
 - 平素體健
 - 但自幼時，每逢入秋即按時咳嗽氣喘兩個多月

射干麻黃湯病案一

- 其他症狀：
 - 初起時噴嚏不止，繼而喉中生痰
 - 呼吸不暢，有時痰聲如鋸木
 - 夜間難以成眠，時需坐起
 - 晨起時有濃痰阻塞喉間，難以咳出
 - 頭暈目眩
 - 舌苔白膩

射干麻黃湯病案一

- 處方：
 - 射干 4.5g 麻黃 6g 款冬 4.5g
紫莞 4.5g 細辛 4.5g 薑半夏 6g
五味子 3g 生薑 6g 紅棗 4 枚
- 初服症即減半，再進二帖諸症盡除。
- 入冬後略感寒涼時，呼吸有聲但片刻即癒。

射干麻黃湯病案二

- 病人資料：
 - 性別：男性
 - 年齡： 1+
 - 主述症狀：
 - 感冒咳嗽四週
 - 高熱 4 天

射干麻黃湯病案二

- 其他症狀：
 - 嘔吐夾帶痰奶
 - 食納不佳
 - 下痢，每日十餘次
 - 呼吸不暢，喉間痰阻，喘促膈動
 - 腹滿微脹
 - 脈虛
 - 舌紅無苔

射干麻黃湯病案二

- 處方一：
 - 射干 2g 麻黃 1.5g 紫菀 2.4g
細辛 1.5g 法半夏 3g 五味子 10 粒
乾薑 1g 紅棗 4 枚
- 二帖體溫降至正常，微咳不喘，胸腹不滿，下痢亦減。脈緩，舌紅苔少

射干麻黃湯病案二

- 處方二：
 - 沙參 6g 麥冬 3g 五味子 20 粒
紫莞 2.4g 法半夏 3g 枇杷葉 9g
生薑 2 片 紅棗 2 枚
- 進二帖後咳止，繼觀察四天後出院。

皂莢丸

- 欬逆上氣，時時吐濁，但坐不得眠，皂莢丸主之
- 組成：
 - 皂莢八兩（刮去皮，酥炙）
- 上一味，研末，蜜和為丸，如梧桐子大。以棗膏和湯服 3 丸，日三夜一服。

皂莢丸病案一

- 曹穎甫《經方實驗錄》：
 - 師曰 《要略》曰：「咳逆上氣，時時吐濁，但坐，不得眠，皂莢丸主之。」按射干麻黃湯證但云咳而上氣，是不咳之時，其氣未必上衝也。若夫本證之咳逆上氣，則喘息而不可止矣。病者必背擁疊被六七層，始能垂頭稍稍得睡。倘疊被較少，則終夜噎咳，所吐之痰黃濁膠黏。此證予於宣統二年，侍先妣邢太安人病親見之。

皂莢丸病案一

- 曹穎甫《經方實驗錄》：
 - 先妣平時喜進厚味，又有煙癖，厚味被火氣薰灼，因變濁痰，氣吸於上，大小便不通。予不得已，自制皂莢丸進之，長女昭華煎棗膏湯，如法晝夜四服。以其不易下咽也，改丸如綠豆大，每服九丸。凡四服，浹晨而大小便通，可以去被安睡矣。後一年，聞吾鄉城北朱姓老婦，以此證坐一月而死，可惜也！

皂莢丸病案二

- 病人資料：
 - 性別：女性
 - 年齡： 50+
 - 主述症狀：
 - 胃體部腺癌末期
 - 癌腫擴散到腹腹及橫結腸，沾黏廣泛，無法手術

皂莢丸病案二

- 其他症狀：
 - 二十多日無法排便
 - 腹痛腹脹
 - 咳吐痰涎，膠粘難咯，難以咳出
 - 全身酸楚
 - 腹痛拒按
 - 脈滑數
 - 舌淡苔黃

皂莢丸病案二

- 處方一：
 - 玄參 30g 麥冬 24g 生地黃 24g
大黃 9g 芒硝 5g
- 進二帖服之無效。

皂莢丸病案二

- 處方二：
 - 皂莢 1 條（去皮炙酥） 大棗 30g
白砂糖 30g 大黃 9g 芒硝 5g
- 以水 500ml 煮至 300ml，分四次服用
- 是夜大便通利，所下者糞少痰多，之後多為膠黏痰涎。
- 繼服二月，腹脹腹痛大減

皂莢丸病案二

- 處方三：
 - 八珍湯：
 - 人參 10g 白朮 10g 茯苓 10g
當歸 10g 川芎 10g 白芍 10g
熟地黃 10g 甘草 5g 大棗 20g
 - 加味皂莢丸：
 - 皂莢 8 條（去皮炙酥） 昆布 50g
莪朮 50g 蜜為丸如梧子大
- 以八珍湯送服加味皂莢丸 3 丸，日 3 服，一年後仍健在，二便正常。

厚朴麻黃湯 / 澤漆湯

- 咳而脈浮者，厚朴麻黃湯主之
- 組成：
 - 厚朴五兩、麻黃四兩、石膏如雞子大、杏仁半升、半夏半升、乾薑二兩、細辛二兩、小麥一升、五味子半升
- 上九味，以水一斗二升，先煮小麥熟，去滓，內諸藥，煮取三升，溫服一升，日三服。

厚朴麻黃湯 / 澤漆湯

- 咳而脈沈者，澤漆湯主之
- 組成：
 - 半夏半升 紫參五兩 澤漆三斤（以東流水五斗，煮取一斗五升）生薑五兩 白前五兩 甘草 黃芩 人參 桂枝各三兩
- 右九味，口父咀，內澤漆汁中，煮取五升，溫服五合，至夜盡。

厚朴麻黃湯 vs 小青龍加石膏湯

- 麻黃：【厚朴麻黃湯】的麻黃是四兩，【小青龍加石膏湯】的麻黃是三兩。
- 姜辛：【厚朴麻黃湯】乾薑細辛各二兩，【小青龍加石膏湯】乾薑細辛各三兩。
- 石膏：【厚朴麻黃湯】石膏如雞子大，【小青龍加石膏湯】石膏二兩。
- 不同：【厚朴麻黃湯】還有厚朴、杏仁、小麥；【小青龍加石膏湯】還有桂枝、白芍、甘草

厚朴麻黃湯病案一

- 趙守真醫案：
 - 朱小祥病患咳嗽，惡寒頭疼，胸悶氣急，口燥煩渴，尿短色黃，脈浮而小弱。
 - 據證分析，其由邪侵肌表，寒襲肺經，肺與皮毛相表裡，故惡寒而咳；濁痰上泛，衝激於肺，以致氣機不利，失於宣化，故胸滿氣促；燥渴者，則為內有鬱熱，津液不布，因之飲水自救；又痰積中焦，水不運化，上下隔阻，三焦決瀆無權，故小便黃短；

厚朴麻黃湯病案一

- 趙守真醫案：
 - 脈浮則屬外邪未解，小弱則因營血虧損，顯示臟氣之不足，如此寒熱錯雜內外合邪之候，宜合治不宜分治，要不出疏表利肺降濁升清之大法，因處以《金匱》厚朴麻黃湯。其方麻、石合用，不惟功擅辛涼解表，而且祛痰力巨；樸、杏寬中定喘，輔麻、石以成功；姜、辛、味溫肺斂氣，功具開闔；半夏降逆散氣，調理中焦之濕痰；

厚朴麻黃湯病案一

- 趙守真醫案：
 - 尤妙在小麥一味補正，斡旋其間，相輔相需，以促成健運升降諸作用。但不可因麻黃之辛，石膏之涼，乾薑之溫，小麥之補而混淆雜亂目之。
 - 藥服 3 劑，喘滿得平，外邪解，煩渴止。再 2 劑，諸恙如失。

澤漆湯病案一

- 病人資料：
 - 性別：女性
 - 年齡：20+
 - 主述症狀：
 - 哮喘病史 10+ 年
 - 因婆媳口角引發哮喘，呼吸困難
 - 服解痙劑及激素類西藥不效

澤漆湯病案一

- 其他症狀：
 - 唇面青灰，汗出如洗
 - 喘促氣急，張口抬肩
 - 雙眼瞪大突出，時而呼吼，時而咳唾

- 脈滑促，重按數
- 舌紫苔滑白

澤漆湯病案一

- 處方：

- 澤漆 30g 薑半夏 20g 紫菀 15g
白前 15g 生薑 15g 桂枝 10g
黃芩 10g 黨參 10g 炙甘草 10g

- 進三帖痰勢趨緩，喘促緩和，夜能成眠。效不更方，再進三帖。
- 三帖後症已緩，飲食如常，改蘇子降氣湯加生晒參，每週五劑，連服十週，隨訪未復發。

麥門冬湯

- 火逆上氣，咽喉不利，止逆下氣者，麥門冬湯主之。
- 組成：
 - 麥門冬七升 半夏一升 人參三兩
甘草二兩 粳米三合 大棗十二枚
- 右六味，以水一斗二升，煮取六升，溫服一升，日三夜一服。

麥門冬湯病案一

- 病人資料：
 - 性別：男性
 - 年齡： 20+
 - 主述症狀：
 - 嗆咳病史七年
 - 每年立春後，清明前定期發作

麥門冬湯病案一

- 其他症狀：
 - 噙咳日夜不休
 - 咳至面紅耳赤，涕淚並出
 - 背冷朝熱
 - 口苦口乾
 - 脈弦細
 - 舌紅苔黃

麥門冬湯病案一

- 處方：
 - 黨參 18g 炒麥冬 12g 炙甘草 5g
粳米一把 紅棗 5 枚
- 進二帖咳嗽大減。
- 效不更方，再進三帖痊愈。隨後一年未復發。

麥門冬湯病案二

- 病人資料：
 - 性別：女性
 - 年齡：40+
 - 主述症狀：
 - 肺炎後咽痛聲啞

麥門冬湯病案二

- 其他症狀：
 - 乾咳少痰
 - 咽喉腫痛
 - 飲食難下
 - 聲音嘶啞難出
 - 神疲氣短
 - 脈細數
 - 舌紅苔少

麥門冬湯病案二

- 處方：
 - 黨參 10g 麥冬 15g 法半夏 5g
粳米 12g 玄參 21g 甘草 3g
桔梗 8g 蟬蛻 5g
- 進三帖咽喉疼痛減輕。
- 效不更方，再進十帖痊癒。

葶藶大棗瀉肺湯

- 肺癰，喘不得臥，葶藶大棗瀉肺湯主之。
- 組成：
 - 葶藶（熬令黃色，搗丸如彈丸大） 大棗十二枚
- 右先以水三升，煮棗取二升，去棗，內葶藶，煮取一升，頓服。

桔梗湯

- 咳而胸滿，振寒脈數，咽乾不渴，時出濁唾腥臭，久久吐膿如米粥者，為肺癰，桔梗湯主之。
- 《傷寒雜病論》條文：少陰病，二、三日咽痛者，可與甘草湯。不差，與桔梗湯。
- 組成：
桔梗一兩 甘草二兩
- 以水三升，煮取一升，分溫再服。

葶藶大棗瀉肺湯 / 桔梗湯病案一

- 病人資料：
 - 性別：男性
 - 年齡：未知
 - 主述症狀：
 - 咳嗽胸痛

葶藶大棗瀉肺湯 / 桔梗湯病案一

- 其他症狀：
 - 咳嗽胸痛，痛引缺盆
 - 吐痰腥臭
- 脈滑實

葶藶大棗瀉肺湯 / 桔梗湯病案一

- 處方一：
 - 桔梗 15g 甘草 15g
- 進五帖胸中痛止，左缺盆痛，諸症依然。

葶藶大棗瀉肺湯 / 桔梗湯病案一

- 處方二：
 - 葶藶子 15g 大棗 12 枚
- 進五帖左缺盆痛止，痰黃厚，時見腥臭，及如米粥者。

葶藶大棗瀉肺湯 / 桔梗湯病案一

- 處方三：
 - 鮮蘆根 120g 生薏仁 30g 桃仁 50 粒
冬瓜子 15g
- 進五帖咳痰腥臭止，及如米粒者亦除。
惟痰尚黃厚。
- 右脈三部浮滑

千金葦莖湯

- 主治：
 - 清肺化痰，逐瘀排膿
- 組成：

葦莖 60g，瓜瓣 60g，薏苡仁 30g，
桃仁 24g。
- 上四味。以水一斗。先煮葦莖。得五升。去滓。內諸藥。煮取二升。服一升。再服。當吐膿。

葶藶大棗瀉肺湯病案一

- 處方四：
 - 粉前胡 9g 生薏仁 30g 桔梗 9g
 - 桃仁 9g 冬瓜子 80 粒 赤豆 18g
 - 大薊 9g 小薊 9g 海藻 6g 蘆根 60g

- 服此二三日，痊癒

葶藶大棗瀉肺湯 / 桔梗湯病案二

- 病人資料：
 - 性別：女性
 - 年齡： 10+
 - 主述症狀：
 - 胸痛咳嗽月餘
 - 經中西醫治療，並無寸進

葶藶大棗瀉肺湯 / 桔梗湯病案一

- 其他症狀：
 - 吐痰腥臭
 - 嗆咳時胸痛劇烈
 - 高熱，撫之烙手
 - 但坐不能平臥
 - 喘息動肩
 - 大便困難
 - 脈滑數
 - 苔膩

葶藶大棗瀉肺湯 / 桔梗湯病案一

- 處方一：
 - 桔梗 15g 甘草 9g 生薏仁 30g
冬瓜仁 30g 桃仁 18g 炙乳沒各 6g
鮮蘆根 24g
 - 犀黃醒消丸，每服三錢，開水送下
- 進一帖咳即減，次日大便通。再服三日，每早大便均暢行。
- 自病發起無一日能安睡。

葶藶大棗瀉肺湯 / 桔梗湯病案一

- 處方二：
 - 甘草 9g 生薏仁 30g
冬瓜仁 30g 桃仁 18g 炙乳沒各 6g
鮮蘆根 24g
 - 葶藶子 9g 炒研，用黑棗去核包麻札入煎。
 - 犀黃醒消丸，每服三錢，開水送下
- 初服四肢厥逆，神識不清，且右胸痛處忽隆起如拳大，半小時後神識回。至晚食慾增，痛定能睡。次日熱退咳減。

葶藶大棗瀉肺湯 / 桔梗湯病案一

- 處方三：
 - 生甘草 15g 白芍 15g 生薏仁 30g
冬瓜仁 30g 桃仁 18g 白芷 3g
炙乳沒各 6g 馬勃 1.5g 敗醬草 9g
 - 葶藶子 9g 炒研，用黑棗去核包麻札入煎。
 - 犀黃醒消丸，每服二錢，開水送下
- 此方連進三日，病漸減，拳腫處亦漸平
- 咳痰黃綠色，咽中痛，大便二日一行，脈細數

葶藶大棗瀉肺湯 / 桔梗湯病案一

- 處方四：
 - 生甘草 9g 桔梗 6g 麥冬 9g
天花粉 18g 絲瓜絡 15g 杏仁 9g
貝母 9g 冬瓜瓣 60g 地枯蘿 6g
- 服藥後，咳時加多，膿痰加多，肩息未除，咽中痛，大便行而堅
- 脈數

葶藶大棗瀉肺湯 / 桔梗湯病案一

- 處方五：
 - 鮮蘆根 9g 西洋參 3g 生薏仁 60g
桔梗 6g 冬瓜瓣 60g 杏仁 12g
絲瓜絡 18g 地枯蘿 12g 南沙參 9g
生甘草 6g
- 服藥後，身熱再減，臭痰亦少
- 肺癰業已出險，咳痰尚濃，身有微熱

葶藶大棗瀉肺湯 / 桔梗湯病案一

- 處方六：
 - 生甘草 15g 桔梗 15g 桃仁泥 6g
生白芍 15g 栝蘘皮 9g 栝蘘仁 9g
冬瓜瓣 60g
生山梔 4.5g
 - 犀黃醒消丸，每服一錢，開水送下
- 服此方後，又有進步
- 但次日夜間吐血數次，不能安寐。

葶藶大棗瀉肺湯 / 桔梗湯病案一

- 處方七：
 - 嫩射干 9g 白前 9g 桃仁泥 6g
生甘草 9g 生白芍 15g 枳殼 3g
全栝藹 18g 桔梗 3g 製香附 9g
生山梔 9g
 - 犀黃醒消丸，每服一錢，開水送下
- 服此方二服後痛定，次日痛全除。
- 時吐濃痰，膠粘黃厚

葶藶大棗瀉肺湯 / 桔梗湯病案一

- 處方八：
 - 牙皂末 1.5g 用黑棗去核包煎
- 服後大量白膩濁痰自大便出，口中吐痰反少。
- 胃納轉佳，胸隆起處已平。咳嗽時胸亦不痛。
- 此方連服三日。改回處方七去山梔，再服二十日。諸症皆平，轉為病後調理。

葶藶大棗瀉肺湯 / 桔梗湯病案一

- 處方九：
 - 合歡皮如手掌大，用水三碗至一碗半，作兩次服
- 服後食量增，肌肉豐。雖偶有微咳帶薄痰，是為病後餘波，不足慮也。

犀黃醒消丸

- 主治：
 - 清熱解毒、消腫止痛。用於癰疽發背、癰瘰流注、乳癰乳岩、無名腫毒
- 組成：

牛黃 6g 麝香 30g 乳香 (制) 200g、
沒藥 (制) 200g 雄黃 100g(《外科全
生集》中去雄黃
- 用溫黃酒或溫開水送服，一次 3g，一日 1 ~ 2 次；患在上部，臨睡前服；患在下部，空腹時服。

千金黃昏湯

- 主治：
 - 肺癰，咳有微熱，煩滿，胸心甲錯。
- 組成：

黃昏（即合歡皮）手掌大 1 片
- 以水 600 毫升，煮取 200 毫升，分作二服。

越婢加半夏湯

- 咳而上氣，此為肺脹，其人喘，目如脫狀，脈浮大者，越婢加半夏湯主之。
- 組成：
 - 麻黃六兩 石膏半斤 生薑三兩 大棗十五枚 甘草二兩 半夏半升
- 右六味，以水六升，先煎麻黃，去上沫，內諸藥，煮取三升，分溫三服。

越婢加半夏湯病案一

- 病人資料：
 - 性別：女性
 - 年齡： 1+
 - 主述症狀：
 - 高熱四天
 - 咳喘氣促

越婢加半夏湯病案一

- 其他症狀：
 - 咽喉腫痛，咽喉間痰聲漉漉
 - 鼻翼煽動，面青唇淡
 - 頭汗出，時有煩燥
 - 食慾不佳
 - 大便稀溏，小便黃
 - 脈沈緊
 - 舌淡苔白

越婢加半夏湯病案一

- 處方一：
 - 麻黃 2.4g 甘草 1.5g 生石膏 9g
法半夏 6g 前胡 3g 炒蘇子 3g
生薑 3 片 大棗 2 枚
- 服藥後微汗出，熱降，煩喘膈煽具減。
大便呈泡沫狀，小便微黃。
- 脈浮數，舌淡苔黃膩。

越婢加半夏湯病案一

- 處方二：
 - 連皮茯苓 3g 法半夏 3g 橘紅 3g
甘草 1.5g 杏仁 3g 前胡 3g
炒蘇子 3g 桑白皮 4.5g 炒萊菔子 3g
竹茹 3g 生薑 3 片
- 體溫正常，精神轉佳，呼吸微喘，咽喉間仍有痰聲，大小便同前，胃納尚差。

越婢加半夏湯病案一

- 處方三：
 - 連皮茯苓 3g 法半夏 3g 橘紅 3g
甘草 1.5g 杏仁 3g 前胡 3g
炒蘇子 3g 桑白皮 4.5g 炒萊菔子 3g
竹茹 3g 生薑 3片 厚朴 2.4g 麥芽 3g
- 服藥後咽喉間略有痰聲外，餘症皆平。
繼續調和肺胃，兼清伏火。

越婢加半夏湯病案一

- 處方四：
 - 法半夏 3g 茯苓 3g 陳皮 1.5g
神麩 2.4g 炒枳殼 1.5g 焦山楂 3g
麥芽 6g 炒萊菔子 3g 杏仁 3g
黃連 0.3g 炒蘇子 2.4g 生薑 2 片
- 服此方後一切正常。

小青龍加石膏湯

- 肺脹，咳而上氣，煩躁而喘，脈浮者，心下有水，小青龍加石膏湯主之。
- 組成：
 - 麻黃 芍藥 桂枝 細辛 甘草 乾薑各三兩 五味子 半夏各半升 石膏二兩
- 右九味，以水一斗，先煮麻黃，去上沫，內諸藥，煮取三升。強人服一升，羸者減之，日三服。小兒服四合。

小青龍加石膏湯病案一

- 病人資料：
 - 性別：女性
 - 年齡： 6+
 - 主述症狀：
 - 肺炎住院三週
 - 發熱咳喘

小青龍加石膏湯病案一

- 其他症狀：
 - 胸悶氣憋
 - 面色青白
 - 大便下痢
 - 肺部囉音較多
 - 脈滑數
 - 舌淡苔灰黑

小青龍加石膏湯病案一

- 處方一：
 - 麻黃 1.5g 乾薑 1g 五味子 10 粒
法半夏 3g 桂枝 3g 生石膏 6g
炙甘草 1.5g 杏仁 10 枚 白芍 1.5g
大棗 2 枚
- 服藥身微熱，面紅潤，咽間有痰，食納進步，大便次數減少，苔灰黑已減，脈滑微數。

小青龍加石膏湯病案一

- 處方二：
 - 法半夏 3g 橘紅 2.4g 炙甘草 1.5g
紫莞 2.4g 五味子 10 粒
細辛 0.9g 炒蘇子 3g 前胡 1.5g
生薑 2 片 大棗 2 枚
- 服藥後熱退，喘憋減，精神轉佳，食納好，脈緩，舌淡苔減。繼服前方而癒。

五臟風寒積聚病脈證並治第十一

- 旋覆花湯
- 麻子仁丸
- 甘草乾姜苓朮湯

旋覆花湯

- 胸痹，其人常欲蹈其胸上，先未苦時，但欲飲熱者，旋覆花湯主之。
- 寸口脈弦而大，弦則為減，大則為芤；減則為寒，芤則為虛，寒虛相搏，此名曰革。婦人則半產漏下，旋覆花湯主之。（婦人雜病脈證并治第二十二）
- 組成：
 - 旋覆花三兩 蔥十四莖 新絳少許
- 上三味，以水三升，煮取一升，頓服。

旋覆花湯病案一

- 病人資料：
 - 性別：女性
 - 年齡： 30+
 - 主述症狀：
 - 左胸脇肋部隱痛月餘

旋覆花湯病案一

- 其他症狀：
 - 平素性情急躁
 - 左胸脇肋部疼痛，生氣時加重
 - 時有口苦
 - 食慾正常
 - 大便偏乾，小便正常
 - 脈弦
 - 舌苔薄白

旋覆花湯病案一

- 處方：
 - 旋覆花 12g（布包） 茜草 10g
柴胡 10g 延胡索 15g 炒白芍 20g
當歸 12g 川芎 15g 香附 10g
炙甘草 10g 蔥 1 根
- 服上方二帖後症狀減輕。效不更方續服二十帖而癒

旋覆花湯病案二

- 病人資料：
 - 性別： 男性
 - 年齡： 40+
 - 主述症狀：
 - 左胸部掣痛年餘

旋覆花湯病案二

- 其他症狀：
 - 左胸部肌肉緊張疼痛，並見索狀隆起
 - 抬左手時疼痛加重
 - 脈弦緊
 - 舌淡苔白

旋覆花湯病案二

- 處方：
 - 旋覆花 9g（布包） 紅花 6g
柴胡 10g 赤芍 15g 枳實 10g
甘草 6g 蔥白 5 根
- 服上方二十六帖，諸症悉除。

麻子仁丸

- 趺陽脈浮而澀，浮則胃氣強，澀則小便數，浮澀相搏，大便則鞭，其脾為約，麻子仁丸主之。
- 組成：
 - 麻子仁二升 芍藥半斤 枳實半斤，炙
大黃一斤，去皮 厚朴一斤，炙，去皮
杏仁一升，去皮尖，熬
- 右六味，蜜和丸如梧桐子大。飲服十丸，日三服，漸加，以知為度。

麻子仁丸病案一

- 劉渡舟醫案：

- 劉 x x, 男, 28 歲。患大便燥結, 五六日排解一次, 每次大便時, 往往因努責用力而汗出濕衣, 但腹中無所苦。口唇髮乾, 用舌津舔之則起厚皮如痂, 撕之則唇破血出。脈沉滑, 舌苔黃。此是胃強脾弱的脾約證。疏以麻子仁丸一料, 服盡而愈。

麻子仁丸病案二

- 病人資料：
 - 性別：男性
 - 年齡： 50+
 - 主述症狀：
 - 腹痛、腹瀉 4 年

麻子仁丸病案二

- 其他症狀：
 - 下痢赤白黏膩
 - 腹痛綿綿
 - 心中煩熱，咽乾口燥
 - 午後潮熱
 - 體虛乏力
 - 脈細數
 - 舌紅苔少

麻子仁丸病案二

- 處方：
 - 麻子仁、大黃(去皮)各 500g，白芍、枳實(炙用)、厚朴(炙、去皮)、杏仁各 250g。
 - 上藥共研為末，煉蜜為丸，每次 9g，每日 1~2 次，溫開水送服
- 服 5 劑後，腹痛、腹瀉較前減輕，飲食、精神略好轉，舌脈同前。

麻子仁丸病案二

- 續服 6 劑，諸症減輕，精神好轉，食慾增進，大便為黃色軟便。
- 續服 5 劑後，痢已止，唯感神疲乏力，稍多進食即覺腹部悶脹，舌淡紅，苔白稍膩，脈細緩。
- 上方加黃芪、雞內金各 10g，黨參 15g，白扁豆 30g。服 5 劑後食慾、精神轉佳，可參加一般體力勞動。後在此方基礎上加減調理而愈，多次復查大便無異常。

甘草乾薑苓朮湯

- 腎著之病，其人身體重，腰中冷，如坐水中，形如水狀，反不渴，小便自利，飲食如故，病屬下焦，身勞汗出，衣裡冷濕，久久得之，腰以下冷痛，腹重如帶五千錢，甘草乾薑朮湯主之。
- 組成：
 - 甘草 白朮各二兩 乾薑 茯苓各四兩
- 右四味，以水四升，煮取三升，分溫三服，腰中即溫。

甘草乾薑苓朮湯病案一

- 病人資料：
 - 性別：男性
 - 年齡：40+
 - 主述症狀：
 - 慢性腎炎 3 年餘

甘草乾薑苓朮湯病案一

- 其他症狀：
 - 尿蛋白陽性
 - 下肢浮腫，按之凹陷
 - 小便量少
 - 脘腹脹悶，納穀不香
 - 便溏
 - 肢倦乏力
 - 脈沉無力
 - 舌淡苔白滑

甘草乾薑苓朮湯病案一

- 處方：
 - 甘草 6g 乾薑 8g 茯苓 10g 白朮 10g
黨參 10g 澤瀉 10g 白茅根 20g
- 堅持服藥 1 月，症狀大減，但尿檢仍呈陽性反應，將乾姜量減至 3g，加蓮子須 6g，同時服用腎氣丸 6g，每天 3 次
- 服用 40 餘天，諸症悉平，尿檢正常

甘草乾薑苓朮湯病案二

- 病人資料：

- 性別：男性

- 年齡：50+

- 主述症狀：

- 因勞累而突感腰骶部重墜涼痛，逐漸加重，並放射到右臀部及右下肢至小腿外側僵硬麻木疼痛

甘草乾薑苓朮湯病案二

- 其他症狀：
 - 走路困難
 - 口乾口渴
 - 無汗
 - 無口苦
 - 食納差
 - 睡眠差
 - 脈沉緊
 - 舌質暗，苔白厚滑膩，中有裂紋

甘草乾薑苓朮湯病案二

- 處方：
 - 乾薑 30g 茯苓 30g 狗脊 30g
杜仲 30g 威靈仙 30g 雞血藤 30g
白朮 20g 炙甘草 20g 麻黃 15g
炮附子 15g (先煎 1h) 細辛 15g
懷牛膝 15g
- 服藥後，重墜麻痛即漸減輕，行走漸能用力，僵硬發涼減輕
- 上方將炮附子加至 25g (先煎 1.5 h) ，
繼服 7 服

甘草乾薑苓朮湯病案二

- 三診時腰腿僵硬麻木感基本消失，疼痛明顯減輕，已可持續行走 1 公里路，食慾改善，已經陣發性疼痛兩個多月的牙痛病也消失了。上方將炮附子加至 30g（先煎 2h），繼服 7 服，痊癒。

痰飲咳嗽病脈證並治第十二

- 本節節錄湯方為：
 - 澤瀉湯
 - 小半夏湯
 - 小半夏加茯苓湯
 - 己椒藶黃丸

澤瀉湯

- 心下有支飲，其人苦冒眩，澤瀉湯主之
- 組成：
 - 澤瀉 5 兩、白朮 2 兩
- 上二味，以水二升，煮取一升，分溫再服。

澤瀉湯病案一

- 病人資料：
 - 性別：男性
 - 年齡： 50+
 - 主述症狀：
 - 頭目冒眩，終日昏昏沉沉

澤瀉湯病案一

- 其他症狀：
 - 兩眼懶睜
 - 雙手顫抖，不能握筆寫字
 - 迭經中西醫治療，病無起色，頗以為苦
 - 脈弦軟
 - 舌肥大異常，苔呈白滑而根部略膩

澤瀉湯病案一

- 處方：
 - 澤瀉 24g 白朮 12g
- 服第一煎，未見任何反應。患者對家屬說：此方藥僅兩味，吾早已慮其無效，今果然矣
- 第二煎後，覆杯未久，頓覺周身與前胸後背濺濺汗出，以手試汗而粘，自覺頭清目爽，身覺輕快之至。又服三劑，繼出微汗少許，久困之疾從此而愈。

澤瀉湯病案二

- 病人資料：
 - 性別：女性
 - 年齡：40+
 - 主述症狀：
 - 眩暈、噁心、嘔吐 2 天
 - 患者長期伏案工作，有頸椎病史。平時很少有體育運動，生活不規律，飲食不節，身體肥胖，2 天前因練習頸椎“米字操”後出現眩暈、噁心、嘔吐

澤瀉湯病案二

- 其他症狀：
 - 眩暈耳鳴
 - 頭重如裹
 - 胸悶噁心
 - 食少多寐
 - 脈濡數
 - 苔白膩

澤瀉湯病案二

- 處方：
 - 澤瀉 30g 白朮 10g 天麻 10g
陳皮 10g 茯苓 10g 半夏 10g
- 3 劑後眩暈明顯好轉，7 劑後症狀消失。

小半夏湯

- 嘔家本渴，渴者為欲解，今反不渴，心下有支飲故也，小半夏湯主之。
- 黃疸病，小便色不變，欲自利，腹滿而喘，不可除熱，熱除必噦。噦者，小半夏湯主之。（黃疸病脈證并治第十六）
- 諸嘔吐，穀不得下者，小半夏湯主之。（嘔吐噦下利病脈證治第十七）
- 組成：
 - 半夏一升 生薑半斤
- 右二味，以水七升，煮取一升半，分溫再服。

小半夏加茯苓湯

- 卒嘔吐，心下痞，膈間有水，眩悸者，小半夏加茯苓湯主之。
- 組成：
 - 半夏一升 生薑半斤 茯苓三兩
- 右三味，以水七升，煮取一升五合，分溫再服。

小半夏湯病案一

- 病人資料：
 - 性別：女性
 - 年齡： 50+
 - 主述症狀：
 - 眩暈嘔吐

小半夏湯病案一

- 其他症狀：
 - 嘔吐頻繁，嘔吐物俱是清水
 - 稍動即覺天旋地轉
 - 每年發作，每次發作月餘
 - 形體肥胖
 - 脈沉軟滑
 - 苔白膩

小半夏湯病案一

- 處方一：
 - 制半夏 12g 生薑 10g
- 三日後複診，眩暈嘔吐俱止。
- 原方加茯苓 12g，再服二劑以鞏固治療效果

小半夏加茯苓湯病案一

- 病人資料：
 - 性別：女性
 - 年齡：40+
 - 主述症狀：
 - 噁心、噯氣、心下痞悶

小半夏加茯苓湯病案一

- 其他症狀：
 - 納食不馨
 - 口苦咽乾
 - 胸悶心悸頭暈
 - 月經 2 ~ 3 月一行，月水量少色暗，呈醬油色
 - 脈沉弦
 - 舌淡苔白膩，

小半夏加茯苓湯病案一

- 處方一：
 - 茯苓 30g 半夏 18 生薑 16 片
- 服藥後第 2 天，噁心、噯氣、心下痞悶均明顯好轉，胸隔間有豁然開朗之感，頭暈心悸若失，值月經來潮，月水顏色轉紅，量亦增多，苔膩已減

小半夏加茯苓湯病案一

- 處方二：
 - 茯苓 30g 半夏 18g 生薑 16 片
澤瀉 15g 白朮 6g
- 腕痞、噯氣、噁心、心悸頭暈均好轉若失，要求鞏固療效

小半夏加茯苓湯病案一

- 處方三：
 - 茯苓 30g 半夏 14g 天麻 10g
豬苓 20g 澤瀉 16g 白朮 10g
桂枝 10g
- 腕痞、噯氣、噁心、心悸頭暈均好轉若失，要求鞏固療效

小半夏加茯苓湯病案二

- 病人資料：
 - 性別：女性
 - 年齡： 5+
 - 主述症狀：
 - 屢屢發作嘔吐，頭眩

小半夏加茯苓湯病案二

- 其他症狀：
 - 患兒嘔吐頗為激烈，兩眼緊閉頻數頭眩有如頭在旋轉
 - 利尿稍減，不渴，大便正常
 - 服五苓散，服完完全無稍差

小半夏加茯苓湯病案二

- 處方：
 - 茯苓 12g 半夏 9g 生薑 5 片
- 小半夏加茯苓湯一口即止。一劑盡後頭眩亦霍然痊癒，連服三劑，之後未曾再發。

己椒薤黃丸

- 腹滿，口舌乾燥，此腸間有水氣，己椒薤黃丸主之
- 組成：
 - 防己 椒目 亭薤（熬） 大黃各一兩
- 右四味，末之，蜜丸如梧子大，先食飲服一丸，日三服，稍增。口中有津液，渴者加芒硝半兩。

己椒蔘黃丸病案一

- 病人資料：
 - 性別：女性
 - 年齡： 60+
 - 主述症狀：
 - 慢性肺氣腫病史多年
 - 喘咳無法平臥

己椒藶黃丸病案一

- 其他症狀：
 - 咳嗽咯白沫痰，量多
 - 氣喘不能平臥
 - 面唇紫紺
 - 頭面胸背汗出
 - 下肢水腫
 - 腹脹滿，噁心欲吐
 - 脈細數
 - 舌淡苔白膩有齒痕

己椒蔞黃丸病案一

- 處方：
 - 防己 10g 大黃 10 椒目 8g
葶蔞子 20g
- 服藥一帖後水瀉數次，腹脹水腫俱減
- 再服後水瀉更多，汗出熱隨之減少，喘促減緩
- 繼之調理，旬月而癒

己椒蔘黃丸病案二

- 病人資料：
 - 性別：女性
 - 年齡：30+
 - 主述症狀：
 - 閉經

己椒藶黃丸病案二

- 其他症狀：
 - 素體健壯，因怒而漸食減
 - 形瘦腹大
 - 腹脹滿
 - 口舌乾燥
 - 腹中漉漉有聲，對面可聞
 - 脈沈細弦
 - 舌淡苔薄白

己椒蔘黃丸病案二

- 處方：
 - 防己 10g 大黃 10 椒目 15g
炒葶蔘子 10g
- 服藥後水瀉，除疲累感外，並腹中有舒適感及飢餓感，脈弦象亦減
- 再服後水瀉約為前次一半，身感舒適，飲食增加
- 繼之調理，月經已通



Q&A