



DAOM 957

從名醫案例分析看癌症的中醫治療


Chao-Cheng Yeh, Ph.D., L.Ac

10/25/2020

V2.5

COVID-19 全球現況

- 歐洲地區在近期內新增新冠病例急速上升，法國從八月開始新增病例呈現指數性增長，並於昨日 10/24/2020 創下新高紀錄，單日新增新冠病例達到 45422 人。



COVID-19 全球現況


- 10/23/2020 全球單日新增新冠病例達到 49 萬人，繼續創下新高紀錄。
- 美國也在同一日寫下單日新增新冠病例紀錄，達到 81414 人。
- 全美新冠死亡人數目前為 23 萬人，每日新增死亡人數則維持在數百至一千人左右。



COVID-19 全球現況


- 時至今日 10/24/2020 全美新冠死亡人數與歐洲的新冠死亡人數相當。

Cumulative number of deaths Europe vs USA (by number of days since 100 deaths)



COVID-19 全球現況

- 根據 University of Washington 的預測，到明年二月時全美新冠死亡人數上看 50 萬人。



倪海廈醫師醫案

- 倪海廈（1954年 - 2012年），美國中醫師，生於台灣，籍貫浙江瑞安，具有美國與中華民國雙國籍，在美國創辦漢唐中醫診所，曾任美國加州中醫藥大學博士指導教授與美國漢唐中醫學院院長。除了中醫之外，他也擅長命理、占卜、風水等，曾以化名梵宇龍授課。一生致力於發揚中醫學與中國文化，自許為經方派現代繼承者。— 引自維基百科



Case: 腦瘤

- 病患：女性
- 年齡：60+
- 症狀：

睡不好

胃口過好，時胃酸反逆

大便時秘，時好

不易出汗

舌苔黃濕，且稍不規則

目前一日服三次 steroid

口渴口乾，喜冷冰飲

雙足有時很熱，晚上尤熱

脈洪大有力



Case: 腦瘤

- 處方：

石膏六兩 知母五錢 旋覆花三錢 代赭石五錢
生半夏四錢 生薑三片 桂枝三錢 白朮三錢
茯苓五錢 豬苓三錢 澤瀉五錢 川芎三錢
丹皮三錢 紅花二錢



Case: 腦瘤

- 解說：

- 胃口過好是 Steroid 造成，所以用白虎湯。
- 不易出汗是環境造成，所以用五苓散，使溼從小便出
- 黃濕舌表示裏熱，造成乾，故病人口渴。
- 腦部瘀血用川芎、丹皮、紅花。
- 重用石膏不單是只清陽明腑熱，還有可以清除肺的腫瘤

生半夏去至高之水，五苓散加生半夏可把腦部的水導下來。



選用處方組成

- 白虎湯（《傷寒雜病論》）：
 - 知母 18 克 (6 兩)，石膏碎 45 克 (1 斤)，甘草炙 6 克 (2 兩)，粳米 18 克 (6 合)
 - 功效：清熱生津，消渴解煩。
 - 主治：陽明熱盛，口乾舌燥，煩渴引飲，面赤惡熱，大汗出，脈洪大有力或滑數。



選用處方組成

- 旋覆代赭湯(《傷寒雜病論》)：
 - 旋覆花 9 克 (3 兩)，生薑 15 克 (5 兩)，人參 6 克 (2 兩)，代赭石 3 克 (1 兩)，甘草炙 9 克 (3 兩)，半夏洗 12 克 (半升)，大棗擘 12 枚
 - 功效：降逆化痰，益氣和胃。
 - 主治：胃氣虛弱，痰濁內阻，心下痞硬，噯氣不除者。



選用處方組成

- 五苓散（《傷寒雜病論》）：
 - 豬苓 9 克，澤瀉 15 克，白朮 9 克，茯苓 9 克，桂枝 6 克
 - 功效：利水滲濕、溫陽化氣。
 - 主治：1，外有表邪、內停水濕。頭痛發熱，煩渴欲飲或水入即吐，小便不利，舌苔白、脈浮。2，水濕內停證，水腫、泄瀉、小便不利、霍亂吐瀉。3，痰飲臍下動悸，吐涎沫而頭眩，或短氣而咳。



Case: 多發性淋巴腫瘤

- 病患：男性
- 年齡：40+
- 症狀：

雙足冷

胃口好

大便每日行

舌苔濕白，舌頭紅厚

身體不熱，不易出汗

口渴尚可，喜冷飲

睡眠好

脈細小無力



Case: 多發性淋巴腫瘤

- 處方：

生附子二錢 乾薑二錢 炙甘草三錢 防己三錢

白朮五錢 茯苓五錢 龍骨三錢 牡蠣一兩

澤瀉五錢



Case: 多發性淋巴腫瘤

- 解說：
 - 四逆湯症用於手冷、足冷、脈細小，若大便不準時用當歸四逆湯。
 - 生附子用量：手足冷二錢，全身冷三錢。



選用處方組成

- 四逆湯（《傷寒雜病論》）：
 - 甘草炙 6 克，乾薑 4.5 克（一兩半），附子生用，去皮，破八片 10 克（1 枚）
 - 功效：溫經逐寒，回陽救逆。
 - 主治：1，陽氣虛衰，陰寒內盛所致，四肢厥逆，惡寒踡臥，神疲欲寐，下利清穀，腹中冷痛，口淡不渴，舌淡苔白，脈沈微。2，因誤汗或大汗淋漓所致亡陽危證，尤宜急用本方。



Case: 乳癌

- 病患：女性
- 年齡：40+
- 症狀：

左乳外側及腋下處有硬塊，已有破皮

便秘，不易出汗

胃口不好

月經提前且有滴漏

舌苔淡白紅

口渴有，喜溫飲

身時覺冷，雙足冷

失眠已半年

脈細小無力



Case: 乳癌

- 處方：

大黃二錢 細辛二錢 炮附子三錢 白朮三錢

桂枝三錢 白芍三錢 炙甘草三錢 大棗十枚

吳茱萸二錢 乾薑二錢 當歸二錢 木通三錢

牡蠣一兩 生附子三錢 (另包) 瓦楞子五錢

防己五錢



Case: 乳癌

- 解說：

- 右脈 > 左脈，脈細小，大便排便不順→大黃附子細辛湯症
- 左乳硬塊，已有破皮流膿→朮附湯
- 膝以下冷，所以用生附子



選用處方組成

- 大黃附子細辛湯（《傷寒雜病論》）：
 - 大黃 9 克 (3 兩)，附子炮 10 克 (3 枚)，細辛 3 克 (2 兩)
 - 功效：溫經逐寒，驅結止痛。
 - 主治：脅下偏痛，發熱，其脈緊弦。



選用處方組成

- 朮附湯（《金匱要略》）：
 - 白朮二兩，附子（炮，去皮）一枚半，甘草（炙）一兩。
 - 功效：暖肌，補中，益精氣。
 - 主治：風濕痺痛，頭眩肢重，及中濕泄瀉，小兒慢驚。



選用處方組成

- 當歸四逆加吳茱萸生薑湯（《傷寒雜病論》）：
 - 當歸 12 克 (3 兩)，桂枝去皮 9 克 (3 兩)，白芍 9 克 (3 兩)，細辛 9 克 (3 兩)，甘草炙 6 克 (2 兩)，通草 6 克 (2 兩)，大棗擘 25 枚，吳茱萸 9 克 (2 升)，生薑切 15 克 (8 兩)
 - 功效：養血通絡，散寒降逆。
 - 主治：素體血虛，內有久寒，又復外受寒邪，手足厥逆，舌淡苔白，脈細欲絕，或兼見頭頂痛，乾嘔、吐涎者。



Case: 直腸癌

- 病患：女性
- 年齡：70+
- 症狀：

大便每日行，便血

胃口好

口渴喜冰水

睡時盜汗

舌苔淡黃濕

小便淡黃

身覺燥熱，雙肘膝以下冷

失眠已三年，服安眠藥

腿痛

尺脈附骨



Case: 直腸癌

- 處方：

厚朴二錢	枳實二錢	大黃三錢	桂枝五錢
白芍四錢	生姜二片	大棗十枚	當歸二錢
木通二錢	細辛二錢	槐花三錢	赤豆三錢
麻黃三錢	白朮三錢	炮附子三錢	炙甘草三錢
防風五錢	知母三錢	麥冬三錢	芒硝三錢 (分三包 沖服)



Case: 直腸癌


- 解說：

- 脈大、四肢逆冷→當歸四逆湯。 裡寒盛→四逆湯。
- 厚樸 + 枳實 + 大黃 + 芒硝→大承氣湯。
- 桂枝 + 白芍 + 大棗 + 當歸 + 木通 + 細辛 + 炙甘草→當歸四逆湯。
- 桂枝 + 麻黃 + 白朮 + 炮附子 + 炙甘草 + 防風 + 知母 + 麥冬→桂枝芍藥知母湯的加減，治療其寒濕造成的腿痛。
- 當歸 + 赤豆 + 槐花→清下焦濕熱。



選用處方組成

- 大承氣湯（《傷寒雜病論》）：
 - 大黃酒洗 12 克 (4 兩)，厚朴去皮，炙 15 克 (8 兩)
枳實炙 12 克 (5 枚)，芒硝 9 克 (3 合)
 - 功效：峻下熱結。
 - 主治：1，陽明腑實證，脘腹痞滿，腹痛拒按，按之硬，大便不通頻轉屎氣，甚或潮熱譫語，手足濇然汗出，舌苔黃厚，乾燥起刺，或焦黑燥裂，脈沈實。2，熱結旁流，下利清水，穢臭異常，臍腹疼痛，按之有塊口乾舌燥，脈滑數。3，裡熱實證之熱厥。



痛，
厥

選用處方組成

- 當歸四逆湯(《傷寒雜病論》)：
 - 當歸 12 克 (3 兩)，桂枝去皮 9 克 (3 兩)，白芍 9 克 (3 兩)，細辛 9 克 (3 兩)，甘草炙 6 克 (2 兩)，通草 6 克 (2 兩)，大棗擘 25 枚 一法 12 枚
 - 功效：養血散寒，溫經通脈。
 - 主治：1，陽氣欠振而又血虛、兼外感寒邪證。手足厥冷、或局部青紫、舌淡苔白、脈沉細。2，寒邪侵入經絡，致腰腿、股足疼痛麻木者。



選用處方組成

- 赤小豆當歸散（《金匱要略》）：
 - 赤小豆三升（浸令芽出，曬乾）（150g），當歸（30g）。
 - 功效：排膿血，除濕熱。
 - 主治：傷寒狐惑；下血，先血後便；腸癰便膿。



選用處方組成

- 桂枝芍藥知母湯（《傷寒雜病論》）：
 - 桂枝 12 克，芍藥 9 克，甘草 6 克，麻黃 12 克，生薑 15 克，白朮 15 克，知母 12 克，防風 12 克，附子 10 克（炮）
 - 功效：祛風除濕、溫經散寒、滋陰清熱。
 - 主治：諸肢節疼痛，身體尪羸，腳腫如脫，頭眩短氣，溫溫欲吐者。



Case: 肺癌

- 病患：女性
- 年齡：80+
- 症狀：

半夜咳，膠痰重

嘔吐出血塊

胸肋悶痛，無法深呼吸

口渴喜溫飲

舌苔淡黃乾

尿道炎

大便褐色

但坐不得臥

胃口不好，手足冷

洪、弦、數、附骨



Case: 肺癌

- 處方一：

十棗湯

- 處方二：

半夏三錢 黃芩三錢 黃柏三錢 南星 3 錢

旋覆花三錢 代赭石三錢 生薑二片 炙甘草三錢

枳實二錢 滑石三錢 豬苓三錢



Case: 肺癌

- 解說：
 - 十棗湯要空腹服用。五小時有效。
 - 半夏三錢，黃芩三錢，黃柏三錢 治尿道炎。
 - 胸滿不可用白芍。
 - 病人服用抗生素。傷胃。吐血是暫時性胃出血。
 - 滑石消炎，去熱痛。



選用處方組成

- 十棗湯（《傷寒雜病論》）：
 - 芫花，甘遂，大戟各等分 大棗 10 枚
先煮棗去滓，內前藥末，強人服一錢，虛人五分，或棗肉為丸，病不除者，再服，得快下後，糜粥自養。
 - 功效：攻逐水飲。
 - 主治：1，懸飲或支飲，停于胸脅，咳唾胸脅引痛，心下痞鞭，乾嘔短氣，頭痛目眩，或胸背掣痛不得息，舌苔滑，脈沉弦。2，水腫，一身悉腫，尤以身半以下為重，腹脹，喘滿，二便不利，屬實證者。



選用處方組成

- 豬苓湯（《傷寒雜病論》）：
 - 豬苓去皮 5 克 (1 兩)，茯苓 5 克 (1 兩)，澤瀉 5 克 (1 兩)，阿膠 5 克 (1 兩)，滑石碎 5 克 (1 兩)。
 - 功效：利水滲濕，清熱養陰。
 - 主治：1，水熱互結證。小便不利、發熱、渴欲飲水；或見心煩不得眠或兼有咳嗽、嘔噁、下利。2，亦治淋疾、尿血、小便澀痛、點滴難出、小腹脹痛者。



Case: 肝癌

- 病患：男性
- 年齡：50+
- 症狀：

睡眠起夜一次（3~4am）

睡時盜汗

口渴喜溫飲

手掌紅，足冷

舌紅無苔

小便深咖啡色，有泡沫

大便每日四次

胃口好

腿酸痛，有時抽筋

脈洪大



Case: 肝癌

- 處方：

生附子三錢（另包） 黃連二錢 黃芩三錢
柴胡三錢 川芎三錢 茜草三錢 炙鱉甲三錢
半夏三錢 天南星三錢 麥冬五錢 天花粉五錢
黨參三錢 白芍五錢 炙甘草三錢 伸筋草四錢
澤瀉五錢 決明子三錢 枸杞子五錢 生硫磺三錢
乾薑二錢 梔子二錢 茵陳三錢



Case: 肝癌

- 解說：
 - 梔子→清虛熱。茵陳→除黃。
 - 治肝先實脾，四神湯甘淡滲利祛濕，所以多煮四神湯當點心。這裡的實脾是指用甘淡滲利的藥，而不是用小建中湯補脾胃。



選用處方組成

- 小柴胡湯（《傷寒雜病論》）：
 - 柴胡 24 克 (半斤)，黃芩 9 克 (3 兩)，人參 9 克 (3 兩)，半夏洗 9 克 (半升)，甘草 9 克 (3 兩)，生薑切 9 克 (3 兩)，大棗擘 12 枚
 - 功效：和解少陽。
 - 主治：1，傷寒少陽證、往來寒熱，胸脅苦滿，不欲飲食、心煩喜嘔、口苦咽乾、脈弦而數、舌苔淡白者。2，婦人傷寒，熱入血室；3，瘧疾、黃疸與內傷雜病，證見少陽證者。



選用處方組成

- 茵陳蒿湯（《傷寒雜病論》）：
 - 茵陳 30 克 (6 兩) 梔子 15 克 (14 枚) 擘 大黃 10 克 (2 兩) 去皮
 - 功效：清熱利濕、消退黃疸。
 - 主治：濕熱黃疸證。一身俱黃如橘子色，腹微滿，小便不利，口渴，舌苔黃膩、脈沈實或滑數。



李可醫師醫案

- 李可（1930年~2013年2月7日）是中國大陸的中醫師與中醫學家，出生於山西靈石。致力於中醫臨床研究52年，提倡扶陽，擅以大量的附子為患者治療，號稱曾治癒十幾萬例重症患者，其中有兩萬多例是被醫院宣判死刑的絕症患者，而被國醫大師鄧鐵濤譽為「中醫的脊梁」。曾任靈石縣中醫院院長、全國民間醫藥學術研究專家委員會委員、香港中醫藥報醫學顧問。—引自維基百科



Case: 胰腺癌術後肝轉移

- 病患：男性
- 年齡：60+
- 症狀：

面色萎黃灰暗

體瘦

舌淡紫，無苔，有齒痕

畏寒甚

腰困如折

食納不香

脈微



Case: 胰腺癌術後肝轉移

- 處方:

高麗參 15g (另煎) , 漂海藻 30g , 炙甘草 30g , 全蠍 12 隻 , 蜈蚣 3 條 (研末沖服) , 白芥子 10g (炒研) , 熟地 30g , 五靈脂 30g , 麻黃 5g , 紫油桂 10g (後 5 分下) , 鹿角霜 45g , 薑炭 15g , 生半夏 75g , 生南星 10g , 制附片 45g , 茯苓 45g , 遼細辛 45g (後 5 分下) , 大貝 120g , 生薑 45g 。



選用處方組成

- 陽和湯：

熟地黃 30 克

鹿角膠 9 克

白芥子 6 克

薑炭 1.5 克

生麻黃 1.5 克

肉桂 3 克

生甘草 3 克

- 功效：溫陽補血、散寒通滯。

- 主治：虛寒陰疽證。患處漫腫、皮色不變，酸痛無熱、舌淡苔白、脈沈細或沈遲。



選用處方組成

- 攻癌奪命湯：

漂海藻、生甘草、木鱉子、醋鱉甲、蛇舌草、夏枯草、蚤休、海蛤殼、黃藥子、生半夏、鮮生薑、元參、牡蠣各 30 克，大貝 15 克，山慈菇、山豆根各 10 克，

“全蟲 12 只，蜈蚣 4 條，明雄黃 1 克”（研粉吞服）



選用處方組成

- 攻癌 2 號方：

炙甘草 60g，乾薑 45g，生附子 30g，生半夏 65~120g，生南星 45~60g，生禹白附 30g，白芥子（炒研） 15~30~45g，漂海藻 45~120g，止癭散 6~3 條，紫油桂（研粉沖） 1.5~3g，生曬參（搗）、五靈脂各 30g，川尖貝 6~12g，麻黃 5g，遼細辛 45g，生薑 75g。



選用處方組成

- 止癎散：
 - 蜈蚣 30 克 全蠍 30 克
 - 功效：祛風通絡止癎。
 - 主治：抗驚厥，鎮靜，鎮痛。主要用於：破傷風、乙型腦炎、顱腦外傷、關節炎、頑固性頭痛，見手足抽搐，角弓反張或頭痛、或關節痛者。



Case: 胃癌全切除

- 病患：女性
- 年齡：30+
- 症狀：

嘔逆不能食

面色蒼黃晦暗

舌淡有齒痕

呃噫不止，滿腹絞痛

但欲寐

脈微細



Case: 胃癌全切除

- 處方一：

炙甘草 120g , 乾薑 90g , 高麗參 30g (另煎)

制附片 100g , 白朮 90g , 油桂 10g (後下)

吳茱萸 30g , 生半夏 75g , 茯苓 45g , 三石各 30g

生山萸肉 120g , 生薑 45g , 生薑汁 10ml , 大棗 25 枚



Case: 胃癌全切除

- 處方二：

制附片 100g ， 油桂 10g （後下） ， 沉香 10g
砂仁 10g （後 7 分下） ， 生山藥 60g ， 茯苓 45g
澤瀉 30g ， 懷牛膝 30g ， 高麗參 30g ， 炙甘草 90g
白朮 90g ， 乾薑 90g ， 蘇合香丸 2 丸 ， 五靈脂 30g
腎四味各 30g ， 烏梅 30g ，



選用處方組成

- 破格救心湯：

附子 30 ~ 200g , 乾姜 60g

高麗參 10 ~ 30g (另煎濃汁兌服)

山萸肉 60 ~ 120g

生龍骨、牡蠣粉、活磁石粉各 30 克

麝香 0.5 克 (分次沖服)



選用處方組成

- 來復湯（張錫純“醫學衷中參西錄”）：

山萸肉 60g、生龍骨粉 30g、生牡蠣粉 30g

生杭芍 18g、野台參 12g、炙甘草 6g

- “凡人元氣之脫，皆脫在肝。故人極虛者，其肝風必先動，肝風動，即元氣欲脫之兆也。又肝與膽臟腑相依，膽為少陽，有病主寒熱往來；肝為厥陰，虛極亦寒熱往來，為有寒熱鼓多汗。萸肉既能斂汗，又能補肝，是以肝虛極而元氣將脫者服之最效。”



選用處方組成

- 溫氏奔豚湯：

附子 30 ~ 200g , 肉桂 10g、紅參 10 ~ 30g

沉香 3 ~ 10g、砂仁 3 ~ 10g、山藥 30 ~ 60g

茯苓、澤瀉、懷牛膝、炙甘草

- 功效：功溫養先天命門真火，救扶元陽之衰亡，固元氣之厥脫。補火生土，化濕醒脾，補土制水，而消水腫。納氣平喘，安養沖脈，引火歸源，制伏奔豚。可消五臟寒積，逐六腑冷凝，除骨脈寒痺，破沉寒痼冷，散寒行氣治諸痛



特殊用藥

- 腎四味：
 - 枸杞子，菟絲子，仙靈脾，補骨脂各 30 克打粉，每服 6-9 克
 - 【性味歸經】：藥性和平，溫而不燥，潤而不膩。歸肝、腎經。
 - 【功效】：益腎精，鼓腎氣。



Case: 胰腺癌

- 病患：女性
- 年齡：50+
- 症狀：

手術後久不收口

面色萎黃灰暗

舌淡紫

食不下

冷戰肢厥

脈微細



Case: 胰腺癌

- 處方：

生附子 30g，乾薑 30g，白朮 90g

高麗參 30g（另煎），炒麥芽 30g，炙甘草 60g

油桂 10g（後下），砂仁米 30g（薑汁炒）

生半夏 45g，茯苓 45g，生薑 45g

- 二診後加入：

公英 120g，皂刺 10g，白芷 10g（後下），炮甲珠

10g，生黃耆 90g



選用處方組成

- 透膿散（出自“外科正宗”）：

黃耆 12 克 當歸 6 克 穿山甲炒 3 克 皂角刺 4.5 克
川芎 9 克

- 方中黃耆一味，生用能益氣托毒排膿，炙用則只能補氣，無托毒之力，且反有助火益毒之弊，故方中黃耆必須生用，重用生黃耆益氣托毒排膿為君；輔以當歸、川芎養血活血；山甲、皂刺消散通透，軟堅穿潰，共為臣藥；黃酒通經行瘀，以助藥勢為佐使。諸藥合用，共奏托毒潰膿之功。



Case: 卵巢癌術後肝轉移

- 病患：女性
- 年齡：50+
- 症狀：

頭角脹痛

面色蒼黃灰暗

厭食，食後胃燒灼感

舌紫暗

目睛向內收引

手腳指端脹痛

時感心悸

脈沈滑



Case: 卵巢癌術後肝轉移

- 處方：

制附子 100g，炮薑 90g，白朮 90g

紅參 90g（杵），龜板 30g，炙甘草 120g

吳茱萸 30g，砂仁米 30g（薑汁炒）

生山萸肉 90g，生薑 45g，大棗 25 枚



選用處方組成

- 潛陽丹：

西砂仁一兩（薑汁炒），附子八錢，龜板二錢
甘草五錢

- 潛陽丹一方，乃納氣歸腎之法也。夫西砂辛溫，能宣中宮一切陰邪，又能納氣歸腎。附子辛熱，能補坎中真陽，真陽為君火之種，補真火即是壯君火也。況龜板一物，堅硬，得水之精氣而生，有通陰助陽之力，世人以利水滋陰目之，悖其功也。佐以甘草補中，有伏火互根之妙，故曰潛陽。方子不似四逆湯加干姜薑，而是以薑汁炒砂仁，以求潛陽納氣之效，而不易傷精耗氣。

吳雄志醫師醫案

- 吳雄志，男，生於 1975 年，四川眉山人，西醫內科學博士，天津市腫瘤醫院中西醫結合科主任醫師，天津醫科大學腫瘤學博士生導師。
- 教育部新世紀優秀人才，中國抗癌協會康復部副部長。主持國家及省部級課題多項，發表 SCI 論文 30 餘篇，獲發明專利 3 項，主編著作兩部。年門診量約 2 萬人次，患者遍及海內外。。—引自中醫在線



Case: 食管癌肺轉移

- 病患：男性
- 年齡：60+
- 症狀：

食道乾澀，飲食難下

食慾不振

舌淡，苔白膩

脈弦而虛

反胃嘔逆，時有反酸



Case: 食管癌肺轉移

- 處方:

- 茵陳 30g , 黃芩 10g , 浙貝母 10g , 廣藿香 10g ,
射干 10g , 豆蔻 6g , 黨參 30g , 法半夏 27g ,
鬱金 10g , 三七 2g , 急性子 30g , 瞿麥 30g ,
威靈仙 30g , 制天南星 18g , 昆布 30g ,
煅瓦楞子 15g , 代赭石 30g , 山豆根 10g , 天龍 5g ,
蒲公英 50g ,



Case: 食管癌肺轉移

- 解說：

- 茵陳、黃芩疏泄上、中焦濕熱而清熱燥濕解毒。
- 豆蔻、廣藿香芳香化濁，醒脾和中。
- 威靈仙、浙貝母、制天南星、昆布、瞿麥化痰濕，消癆結。
- 三七、急性子破淤血，消癥瘕。
- 天龍攻毒邪，軟堅結



選用處方組成

- 甘露消毒丹（《醫效秘傳》）：
 - 飛滑石十五兩，綿茵陳十一兩，淡黃芩十兩，石菖蒲六兩，川貝母五兩，木通五兩，藿香四兩，射干四兩，連翹四兩，薄荷四兩，白豆蔻四兩
 - 功效：清熱解毒、化濁利濕。
 - 主治：濕溫、暑溫、瘟疫初起、邪在氣分、濕熱並重者。



特殊用藥

- 急性子：
 - 即鳳仙花的乾燥成熟種子。
 - 【性味歸經】：微苦、辛，溫；有小毒。歸肺、肝經。
 - 【功效】：破血軟堅，消積。
 - 【主治】：癥瘕痞塊，經閉，噎膈。



特殊用藥

- 天龍：
 - 即壁虎，又名守宮。
 - 【性味歸經】：鹹，寒。有小毒。
 - 【功效】：祛風，定驚，止痛，散結。
 - 【臨床應用】
 - 1. 用於驚風，癲癇，破傷風，以及風濕性關節疼痛等症。
 - 2. 用於療歷結核，以及癌腫。壁虎具有散結、止痛等作用，



Case: 胃癌縱膈淋巴結轉移

- 病患：女性
- 年齡：60+
- 症狀：

面色萎黃，身重困倦

大便黏膩不易解

化療一周但無法耐受

舌色青紫，苔薄白

胃納呆滯，口淡不渴

形體消瘦

脈滑數



Case: 胃癌縱膈淋巴結轉移

- 處方:

- 黨參 20g , 醋商陸 9g , 白英 20g , 白花蛇舌草 30g , 制天南星 54g , 土茯苓 30g , 半枝蓮 30g , 陳皮 6g , 茯苓 10g , 甘草 3g , 五加皮 10g , 仙鶴草 30g , 醋香附 10g , 薏苡仁 45g , 栝藹 30g , 黃耆 30g , 預知子 10g , 青礞石 10g , 野葡萄根 30g , 三七 2g , 醋五靈脂 10g , 白朮 10g , 貓人參 50g , 土貝母 6g ,



Case: 胃癌縱膈淋巴結轉移

- 解說：

- 礞石、薏苡仁、栝蘘、制天南星、土茯苓化痰散結。
- 土貝母、醋商陸軟堅散結消癥瘕。
- 三七、醋五靈脂活血化淤。
- 化療後熱毒尚存，以白花蛇舌草、半枝蓮、白英清熱解毒。
- 香附、預知子、貓人參、醋五靈脂入肝經，疏肝理氣，祛邪扶正



選用處方組成

- 礞石滾痰丸（《泰定養生主論》）：
 - 大黃酒蒸 240 克 片黃芩酒洗淨 240 克 金礞石捶碎，用火硝 30g，放入小砂罐內蓋之，鐵線縛定，鹽泥固濟，曬乾，火煅紅，候冷取出
 - 功效：用於實熱老痰，發為癲狂，或怔忡昏迷，或咳喘痰稠，或胸脘痞悶，或眩暈耳鳴，或繞項結核，或口眼蠕動，或不寐，或夢寐奇怪之狀，或骨節卒痛難以名狀，或噎息煩悶，大便秘結，舌苔黃厚，脈滑數有力。



特殊用藥

- 商陸：
 - 商陸科植物商陸或垂序商陸的乾燥根。
 - 【性味歸經】：苦，寒；有毒。歸肺、脾、腎、大腸經。
 - 【功效】：逐水消腫，通利二便，解毒散結。
 - 【主治】：用於水腫脹滿，二便不能；外治癰腫瘡毒。



特殊用藥

- 白英：
 - 茄科茄屬植物白英的全草。
 - 【性味歸經】：苦，微寒。入肝、膽經。
 - 【功效】：清熱解毒，利濕、祛風。
 - 【主治】：癌腫、黃疸型肝炎、膽石症、膽囊炎、瘡療癰腫、丹毒、風濕痹痛。



特殊用藥

- 野葡萄根：
 - 為葡萄科植物秋葡萄或刺葡萄的根。
 - 【性味歸經】：味甘，性平，無毒。入肝、腎經。
 - 【功效】：行血，消積，清熱解毒。
 - 【主治】：治癰疽疔瘡；慢性骨髓炎，吐血，腹脹症積，筋骨傷痛，痔瘡，遺精，白濁。



特殊用藥

- 預知子：
 - 即木通的乾燥成熟果實。
 - 【性味歸經】：味甘微苦，性寒。入肝、胃、膀胱三經。
 - 【功效】：舒肝理氣，活血止痛，利尿，殺蟲。
 - 【主治】：用於腕脅脹痛、經閉痛經、小便不利、蛇蟲咬傷。



特殊用藥

- 貓人參：
 - 獼猴桃科植物鑷合獼猴桃的干燥根及根莖。
 - 【性味歸經】：苦、澀，涼。入肝、脾、胃、膀胱經。
 - 【功效】：清熱解毒，消腫。
 - 【主治】：呼吸道感染，夏季熱，白帶，癰腫瘡癤，消化系統腫瘤，痲風病。



特殊用藥

- 土貝母：
 - 葫蘆科植物土貝母的干燥塊莖。
 - 【性味歸經】：苦、涼。入肺、脾經。
 - 【功效】：散結，消腫，解毒。
 - 【主治】：散結毒，消癰腫。治乳癰，癰癥痰核，瘡瘍腫毒及蛇蟲毒。



Case: 直腸癌肝多發轉移

- 病患：男性
- 年齡：60+
- 症狀：

消瘦腹滿，兩目黯黑

咽乾口渴，燒心口苦

睡眠欠佳

舌紫黯少苔

肌膚甲錯

饑不欲食，大便秘結

脈微細



Case: 直腸癌肝多發轉移

- 處方:

- 山楂 10g , 蠶沙 30g , 烏梅 30g , 醋鱉甲 10g ,
野葡萄根 30g , 醋商陸 9g , 貓人參 30g , 白芍 30g ,
醋五靈脂 20g , 白英 20g , 三七 2g , 生赭石 30g ,
桃仁 10g , 土鱉蟲 10g , 仙鶴草 30g , 貓爪草 30g ,
馬齒莧 30g , 酒大黃 5g , 雞血藤 30g , 炒殭蠶 10g ,
半枝蓮 20g , 浙貝母 30g , 白花蛇舌草 20g ,
敗醬草 30g



Case: 直腸癌肝多發轉移

- 解說：

- 肝藏血、白芍養血斂陰。
- 大黃、桃仁、土鱉蟲、三七、雞血藤、野葡萄根破血逐瘀。
- 醋鱉甲、醋商陸、貓爪草、貓人參軟堅散結抗癌。
- 白花蛇舌草、敗醬草、仙鶴草、半枝蓮清熱解毒。
- 腸道為鹼性環境，選用烏梅、山楂、白芍等酸性收斂藥物治療。
- 五靈脂、蠶沙泄腸道濁邪。



選用處方組成

- 大黃蟪蟲丸（《傷寒雜病論》）：
 - 大黃 75 克，黃芩 60 克，甘草 90 克，桃仁 120 克，杏仁 120 克，白芍 120 克，熟地黃 300 克，乾漆 30 克，虻蟲 60 克，水蛭 50 克，蟻螬 60 克，土鱉蟲 30 克
 - 功效：祛瘀生新，養血益陰。
 - 主治：子宮肌瘤、卵巢囊腫、肝硬化、脾腫大、手術後腸粘連、子宮內膜性閉經、卵巢性閉經、血栓閉塞性脈管炎、腦血栓形成，見腹滿疼痛拒按，痛處固定，納差，兩目暗黑，脈弦澀者。



特殊用藥

- 蠶沙：
 - 為蠶蛾科昆蟲家蠶幼蟲的糞便。
 - 【性味歸經】：味甘、辛，性溫。歸肝、脾、胃經。
 - 【功效】：祛風除濕、和胃化濁。
 - 【主治】：主療風濕之病。治爛弦風眼，消渴癥結，及婦人血崩，頭風、風赤眼、去風降濕。



特殊用藥

- 馬齒莧：
 - 為馬齒莧科植物馬齒莧的乾燥全草。
 - 【性味歸經】：甘、酸、涼。歸肝、大腸、膀胱經。
 - 【功效】：清熱解毒、涼血止痢、利尿除濕、通大便、明目。
 - 【主治】：用於濕熱下痢，熱毒瘡瘍，崩漏便血，熱淋血淋。



Case: 肝彌漫多發腫物

- 病患：男性
- 年齡：40+
- 症狀：

形體消瘦

口苦咽乾

腹部脹滿不適

舌淡

不思飲食

脇下痞硬脹痛

脈弦有力



Case: 肝彌漫多發腫物

- 處方:

- 黨參 30g , 蜂房 10g , 瞿麥 30g , 制天南星 30g , 天龍 5g , 醋鱉甲 10g , 柴胡 24g , 甘草 3g , 薏苡仁 60g , 黃芩 10g , 龍葵 15g , 茜草 30g , 防己 30g , 凌霄花 6g , 雞內金 10g , 土貝母 6g , 醋商陸 9g , 法半夏 9g , 三七 2g



Case: 肝彌漫多發腫物

- 解說：

- 鱉甲為厥陰經主藥，長於軟堅化癥。
- 凌霄花、三七、茜草活血化瘀。凌霄花入足厥陰肝經，有抗腫瘤作用。
- 瞿麥利尿又復形質，且有抗雌激素作用。
- 柴胡、人參、黃芩、半夏和解少陽。
- 防己利水除濕，龍葵清熱解毒，活血消腫。
- 蜂房攻毒散結，共抗腫瘤。



選用處方組成

- 鱉甲煎丸（《傷寒雜病論》）：
 - 鱉甲炙 36 克 射干燒 9 克 黃芩 9 克 柴胡 18 克 地虱熬 9 克 乾薑 9 克 大黃 9 克 赤芍藥 15 克 桂枝 9 克 葶藶子熬 3 克 石韋去毛 9 克 厚朴 9 克 牡丹皮去心 15 克 瞿麥 6 克 紫葳 9 克 半夏 3 克 人參 3 克 蟪蟲 15 克 阿膠炙 9 克 蜂窩炙 12 克 芒硝 36 克 蜣螂熬 18 克 桃仁 6 克
 - 功效：化癥消癥，化痰散結。
 - 主治：1、瘰癧。症見脅下有痞塊，或疼痛，或拒按、舌紫或癍斑、脈澀或弦。2、五臟癥血痰結證。症見癥塊疼處硬而固定、按之不移。

特殊用藥

- 龍葵：
 - 為茄科植物龍葵的全草。
 - 【性味歸經】：苦、微甘，寒。有小毒。
 - 【功效】：清熱，解毒，活血，消腫。
 - 【主治】：治疗瘡，癰腫，丹毒，跌打扭傷，慢性氣管炎，急性腎炎。用於瘡癰腫毒、皮膚濕疹、小便不利、老年慢性氣管炎、白帶過多、前列腺炎、痢疾。



特殊用藥

- 凌霄花：
 - 為紫葳科植物凌霄的花。
 - 【性味歸經】：甘、酸，寒。歸肝、心包經。
 - 【功效】：行血去瘀，涼血祛風。
 - 【主治】：用於經閉癥瘕，產後乳腫，風疹發紅，皮膚瘙癢，瘰癧。



Case: 胰臟癌肝轉移

- 病患：女性
- 年齡：70+
- 症狀：

心煩口渴

飲食不振

小便不利

舌淡苔白

脇痛腹脹

大便溏瀉

脈弦緩



Case: 胰臟癌肝轉移

- 處方:

柴胡 24g , 黃芩 10g , 木香 6g , 川楝子 10g ,
桂枝 12g , 白芍 10g , 乾薑 6g , 天花粉 10g ,
甘草 3g , 土貝母 6g , 天龍 3g , 薏苡仁 75g ,
龍葵 15g , 枸杞子 10g , 麥芽 30g , 石見穿 30g ,
半枝蓮 30g , 醋商陸 9g , 蜂房 5g , 膽南星 g ,
貓人參 50g , 夏枯草 30g , 醋鱉甲 10g



Case: 胰臟癌肝轉移

- 解說：

- 白芍養肝血，且能促進膽汁排泄，抗腫瘤。
- 木香、川楝子疏肝理氣，麥芽健胃消食。
- 薏苡仁是抗胰腺癌的特殊藥物，但劑量需大。
- 醋鱉甲則是針對患者肝轉移的用藥。
- 膽南星入厥陰肝經，清熱化痰以抗腫瘤。
- 夏枯草清熱散結消腫，且具有保肝作用。



選用處方組成

- 柴胡桂枝乾薑湯（《傷寒雜病論》）：
 - 柴胡 24 克（8 兩） 桂枝去皮 9 克（3 兩） 乾薑 6 克（2 兩） 栝蘘根 12 克（4 兩） 黃芩 9 克（3 兩） 牡蠣熬 6 克（2 兩） 甘草炙 6 克（2 兩）
 - 功效：和解少陽，溫化水飲。
 - 主治：少陽病兼水飲內結。




特殊用藥

- 石見穿：
 - 為唇形科鼠尾草屬植物紫參，以全草入藥。
 - 【性味歸經】：微苦，平。
 - 【功效】：清熱解毒，活血鎮痛。
 - 【主治】：用於黃疸型肝炎，癌症，腎炎，白帶，痛經，淋巴結結核，象皮病；外用治面神經麻痺，乳腺炎，癰腫。



參考書目

- 跟師李可抄方記（腫瘤篇）
- 作者：張涵記錄
- 出版社：中國醫藥科技出版社
- ISBN：978-7-5067-4663-2



參考書目

- 消化系統腫瘤：吳雄志
腫瘤治療醫案精選集
- 作者： 吳雄志
- 出版社： 遼寧科學技術
出版社
- ISBN： 978-7-5381-9718-
1





Q&A

